
第 3 章

死 因 統 計

1 死 因 の 概 況

平成25年における本県の死因順位(表 1)を見ると、第1位が悪性新生物、第2位が心疾患、第3位が肺炎であり、この3大死因が全死亡の約55%を占めていることがわかる。

表 1 主要死因別死亡数・死亡率・死亡割合

(宮 崎 県)

| 死 因 順 位 | 死 因 | 平 成 25 年 | | | 平 成 24 年 | | |
|------------|-----------|----------|-------------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| | | 死 亡 数 | 死 亡 率 (人口10万対) | 死亡総数 に占める 割合(%) | 死 亡 数 | 死 亡 率 (人口10万対) | 死亡総数 に占める 割合(%) |
| 第 1 位 | 悪 性 新 生 物 | 3,526 | 314.6 | 27.3 | 3,483 | 309.4 | 26.7 |
| 第 2 位 | 心 疾 患 | 2,205 | 196.8 | 17.1 | 2,200 | 195.4 | 16.9 |
| 第 3 位 | 肺 炎 | 1,303 | 116.3 | 10.1 | 1,464 | 130.0 | 11.2 |
| 第 4 位 | 脳 血 管 疾 患 | 1,289 | 115.0 | 10.0 | 1,420 | 126.1 | 10.9 |
| 第 5 位 | 老 衰 | 556 | 49.6 | 4.3 | 498 | 44.2 | 3.8 |
| 第 6 位 | 不 慮 の 事 故 | 439 | 39.2 | 3.4 | 462 | 41.0 | 3.5 |
| 第 7 位 | 腎 不 全 | 297 | 26.5 | 2.3 | 272 | 24.2 | 2.1 |
| 第 8 位 | 自 殺 | 256 | 22.8 | 2.0 | 277 | 24.6 | 2.1 |
| 第 9 位 | 慢性閉塞性肺疾患 | 183 | 16.3 | 1.4 | 199 | 17.7 | 1.5 |
| 第10位 | 大動脈瘤及び解離 | 154 | 13.7 | 1.2 | 135 | 12.0 | 1.2 |

表 2 主要死因別死亡数・死亡率・死亡割合

(全国)

| 死 因 順 位 | 死 因 | 平 成 25 年 | | | 平 成 24 年 | | |
|------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| | | 死 亡 数 | 死 亡 率 (人口10万対) | 死亡総数 に占める 割合(%) | 死 亡 数 | 死 亡 率 (人口10万対) | 死亡総数 に占める 割合(%) |
| 第 1 位 | 悪 性 新 生 物 | 364,872 | 290.3 | 28.8 | 360,963 | 286.6 | 28.7 |
| 第 2 位 | 心 疾 患 | 196,723 | 156.5 | 15.5 | 198,836 | 157.9 | 15.8 |
| 第 3 位 | 肺 炎 | 122,969 | 97.8 | 9.7 | 123,925 | 98.4 | 9.9 |
| 第 4 位 | 脳 血 管 疾 患 | 118,347 | 94.1 | 9.3 | 121,602 | 96.5 | 9.7 |
| 第 5 位 | 老 衰 | 69,720 | 55.5 | 5.5 | 60,719 | 48.2 | 4.8 |
| 第 6 位 | 不 慮 の 事 故 | 39,574 | 31.5 | 3.1 | 41,031 | 32.6 | 3.3 |
| 第 7 位 | 自 殺 | 26,063 | 20.7 | 2.1 | 26,433 | 21.0 | 2.1 |
| 第 8 位 | 腎 不 全 | 25,101 | 20.0 | 2.0 | 25,107 | 19.9 | 2.0 |
| 第 9 位 | 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 | 16,443 | 13.1 | 1.3 | 16,402 | 13.0 | 1.3 |
| 第 10 位 | 大 動 脈 瘤 及 び 解 離 | 16,105 | 12.8 | 1.3 | 15,831 | 12.6 | 1.3 |

死因の第1位となった悪性新生物について、本県での部位別死亡をみると、「気管・気管支及び肺」が最も多く625人である。

表 3 悪性新生物部位別死亡数

| | 平 25 | | | 平 24 | | | 平 23 | | | 平 22 | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 総 数 | 2,054 | 1,472 | 3,526 | 2,083 | 1,400 | 3,483 | 2,069 | 1,415 | 3,484 | 1,979 | 1,448 | 3,427 |
| 口唇、口腔 及び咽頭 | 51 | 19 | 70 | 49 | 15 | 64 | 39 | 19 | 58 | 53 | 30 | 83 |
| 食 道 | 79 | 19 | 98 | 84 | 12 | 96 | 88 | 13 | 101 | 86 | 8 | 94 |
| 胃 | 263 | 142 | 405 | 293 | 125 | 418 | 300 | 189 | 489 | 286 | 166 | 452 |
| 結 腸 | 139 | 160 | 299 | 103 | 152 | 255 | 153 | 124 | 277 | 131 | 144 | 275 |
| 直腸S状結 腸移行部 | 59 | 49 | 108 | 88 | 42 | 130 | 86 | 40 | 126 | 72 | 52 | 124 |
| 肝及び肝内 胆 管 | 210 | 113 | 323 | 229 | 106 | 335 | 195 | 111 | 306 | 191 | 132 | 323 |
| 胆のう及び 他の胆道 | 102 | 119 | 221 | 118 | 103 | 221 | 125 | 114 | 239 | 105 | 109 | 214 |
| 膵 | 171 | 147 | 318 | 156 | 156 | 312 | 141 | 134 | 275 | 131 | 151 | 282 |
| 咽 頭 | 6 | 1 | 7 | 11 | 0 | 11 | 8 | 1 | 9 | 11 | 1 | 12 |
| 気管、気管 支及び肺 | 496 | 212 | 708 | 448 | 177 | 625 | 463 | 191 | 654 | 462 | 183 | 645 |
| 皮 膚 | 8 | 10 | 18 | 5 | 9 | 14 | 11 | 6 | 17 | 9 | 7 | 16 |
| 乳 房 | 2 | 95 | 97 | 3 | 103 | 106 | 1 | 95 | 96 | 1 | 108 | 109 |
| 子 宮 | - | 70 | 70 | - | 73 | 73 | - | 73 | 73 | - | 72 | 72 |
| 卵 巢 | - | 38 | 38 | - | 38 | 38 | - | 46 | 46 | - | 31 | 31 |
| 前 立 腺 | 127 | - | 127 | 136 | - | 136 | 121 | - | 121 | 107 | - | 107 |
| 膀 胱 | 52 | 21 | 73 | 47 | 26 | 73 | 36 | 20 | 56 | 58 | 28 | 86 |
| 中枢神経系 | 10 | 11 | 21 | 8 | 9 | 17 | 7 | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 悪性リンパ腫 | 58 | 53 | 111 | 60 | 62 | 122 | 58 | 43 | 101 | 48 | 41 | 89 |
| 白 血 病 | 74 | 67 | 141 | 78 | 72 | 150 | 87 | 62 | 149 | 80 | 51 | 131 |
| その他のリン パ 組 織 | 24 | 33 | 57 | 35 | 22 | 57 | 18 | 28 | 46 | 23 | 23 | 46 |
| そ の 他 | 123 | 93 | 216 | 132 | 98 | 230 | 132 | 99 | 231 | 117 | 105 | 222 |

図1 6大死因による死亡率(人口10万対)の年次別推移

