

# ヤンバルトサカヤスデのまん延防止に御協力ください！

ヤンバルトサカヤスデの生息が確認されています。

(宮崎市・高鍋町・西都市・国富町・新富町・都城市)

※人体に害はありませんが、外見や臭いから強い不快感を与える「不快害虫」です

## ヤンバルトサカヤスデとは？

**分布**・台湾原産の外来生物  
・宮崎県でも各地で発生

**特徴**・生息域から、樹木等の移植の際に土や堆肥とともに運ばれてくる。  
・昼間は、庭の植木や菜園の土中等、日当たりの悪い湿った場所に潜み、夜間に集団で活動。  
・集団移動の際におびただしい数が壁や塀に登り、家屋に侵入した事例もある。

## 発生時期

4～6月(幼虫の放散)、10～11月(成虫の繁殖期)の年2回集団移動がみられる。

## 人体に害はある？

- 毒はなく、刺咬などの人体に対する直接的な危険性はない。
- 熱湯や雨水、燃焼といった刺激を加えると、シアン化合物を含む悪臭を伴うガスを放ち、大量に吸うと頭痛や吐き気などの症状に襲われることがあるので注意が必要。



## 在来種との見分け方

### ■ 在来種のヤスデ



色 : 黒褐色

体長: 10～25mm

### ■ ヤンバルトサカヤスデ



住宅のコンクリートを好んで摂食

色 : 黄～茶褐色

体長: 25～35mm

黒い紋が特徴

# ● 駆除・防除方法

## 一般向け

- 表面がツルツルした所は歩行できないため、紙製のガムテープを家屋の周りに貼ることで侵入を防止することができます。
- コイレット（忌避剤<sup>きひざい</sup>）やスプレー（緊急時）など、薬剤による処理が効果的です。  
コイレットは3kgで約100㎡散布できます。土壌面や鉢の下に散布し、砂利がある場合は多めに散布すると効果的です。
- 死骸を放置すると、雨に濡れて強烈な悪臭（シアン化ガス）を放ちます。駆除後は、市町村の規定にしたがってゴミに出しましょう。

## 事業者向け

### ● 土壌搬出対策

持ち出しを行う現場の土砂を移動する際、落葉等の残渣を除去しましょう。残渣は自治体の規定に従い処理しましょう。焼却ができない場合は、厚さ30cm以上の土壌中に埋め、土圧による分散防止を図りましょう。

### ● 工事車両対策

生息地に駐留した重機等の工事車両を移動する際は、窪み部・平面部の洗浄ならびにブラッシングを行いましょ。運搬車両の移動時は、荷台とともに積載物も同様の処理を行いましょ。

### ● 工事地区内の防除

工事場所が生息域の場合、車両や工事資材等の駐留物を囲むように土壌に薬剤を散布しましょ。搬出物にヤンバルトサカヤスデが付着していないかよく確かめ、発見時は搬出現場で薬剤処理を徹底し、現場に出入りする際は、工事車両のタイヤ周りや機材等を薬剤で処理しましょ。

### ● 園芸業者における対策

根付植物や鉢植植物の出荷元または市場での防除対策を徹底しましょ。フェノルカブを主成分とした液状製剤による浸漬法が適しています。

ヤンバルトサカヤスデの発生に悩まれている方は、下記まで御相談ください。

機関名	所在地	電話番号
宮崎県自然環境課野生生物担当	宮崎市橘通東2-10-1	0985-26-7291
中部農林振興局 林務課	宮崎市橘通東1-9-10	0985-26-7283
南那珂農林振興局 林務課	日南市戸高1-12-1	0987-23-4317
北諸県農林振興局 林務課	都城市北原町24-21	0986-23-4523
西諸県農林振興局 林務課	小林市細野367-2	0984-23-4725
児湯農林振興局 林務課	高鍋町大字北高鍋2870-1	0983-22-1350
東臼杵農林振興局 林務課	延岡市愛宕町2-15	0982-32-6157
西臼杵支庁 林務課	高千穂町大字三田井22	0982-72-3178